児は、 症状が出ません。しかし、 んどの場合、軽い症状で済むか、 何度も経験しているため、 に症状が強く出ます。 大人はロタウイルスの感染を 特に初めて感染したとき 激しい症状が出ることが 乳幼 ほと

やすく、

この時期に1回目のロ

タウイルスワクチンを受けると、

り合う病気の腸重積症にかかり

ています。

月齢が進むと、

腸と腸がはま

重症化予防に効果があるとされ

クチンの接種を受けることは、

スが原因です。

ロタウイルスワ

者のうち40~50%はロタウイル 5歳までの急性胃腸炎の入院患 なったりすることがあります。 必要となったり、入院が必要に 脱水症状がひどくなると点滴が ロタウイルスとは

ウイルスに感染するといわれて 染力が強く、ごくわずかなウイ います。 までにほぼ全ての子どもがロタ 6歳頃)にかかりやすく、 てしまいます。乳幼児期 ルスが体内に入るだけで感染し を引き起こすウイルスです。感 ロタウイルスは急性の胃腸炎 5歳 0

主な症状

予防接種法に基づく定期接種になります。 定期接種の方法についてお知らせします。 10月1日から、

ロタウイルスワクチンは

定期接種の対象とワクチンの接種方法

- 象/令和2年8月1日以降に生まれた乳児 対
- 用/10月1日(木)以降の接種は無料
- 類/ロタウイルスワクチンは、2種類(どちらも□から飲む生ワクチン)あり、同様の効果があります。同じ 種類のワクチンで、決められた回数を接種します

吐き気、嘔吐、発熱、

腹痛です。

主な症状は、水のような下痢

接種回数/下表をご覧ください

ましょう。


乳児の早目の時期に接種を受け

ます。腸重積症が起こりにくい よりその発症のリスクが高まり

接種場所/市内の協力医療機関(予診票に同封します)

申込方法/送付された予診票を持参し、各医療機関へ(事前に電話で予約してください)

※対象者には、9月下旬から順次予診票を送付します。



問合せ/健康政策課

5 64-9023 **2**64-7172 Eho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市予防接種モバイルサイトでは、予 防接種や健診など子育て支援情報をご確 認いただけます。ぜひご活用ください。

二次元コードも利用できます▶



10月1日から定期接種になります

忘れ